

治療説明書 AGA 治療薬

デュタステリドによる男性型脱毛症（AGA）治療を受けられる方へ

○男性型脱毛症（AGA）について

男性型脱毛症（以下、AGA）は壮年期脱毛とも呼ばれ、思春期以降に額の生え際や頭頂部の髪が、どちらか一方あるいは両方から薄くなり、徐々に進行していく状態のことを言います。

たとえば円形脱毛症では、急激に脱毛が進行しますが、AGA では徐々に進行しているのが特徴のひとつであり、額の生え際や頭頂部の髪の毛が細くなって、うぶ毛のような十分育たない髪の毛が多くなり、抜け毛が進行して頭皮が透けて見えるようになります。

親、兄弟、祖父母に脱毛症を認めることが多いのも AGA の特徴の一つです。

○デュタステリドについて

デュタステリドは、男性型脱毛症用薬に分類されます。

AGA の人の頭皮部分にあるとされる男性型脱毛症の原因物質である、ジヒドロテストステロンという物質に変換する 1 型及び 2 型の 5α 還元酵素を阻害することで発毛を促進します。

○値段

デュタステリド ZA0.5mg30 錠（30 日分）で 8,000 円(税込)です。

当院初診の方は、初診料 550 円(税込)が別途かかります。

○デュタステリドの使い方について

1. 1 日 1 回内服してください

このお薬は、1 日 1 回の内服を継続することで発毛を促進する効果が期待できる薬剤です。食事の影響を受けないのでいつでも服用できます。3 か月で効果があらわれる人もいますが、通常効果が出るまでに 6 か月間以上飲み続ける必要があります。効果を継続させるためにも服用を続けることが大切です。すべての人に効果があるわけではないことをご理解ください。

2. 女性や子供は服用しないでください

妊娠している女性では、男子胎児の生殖器官などの発育に影響を及ぼすおそれがあります。

3. PSA 検査を受ける方へ

PSA 検査とは、前立腺癌の血液検査です。デュタステリドは、PSA 値を減少させることがあります。PSA 検査を受ける際には、デュタステリドを服用していることを必ず担当の医師にお伝えください。デュタステリド服用中でも、PSA 検査を通常通り受けることはできます。

4. デュタステリド服用中は献血をしないでください。

デュタステリドを最後に服用して 6 か月間は献血をしないでください。

5. 他の人にあげないでください

デュタステリドを使用される方が、来院して処方を受けてください。

○デュタステリドで起こりうる副作用について

- ・ 10 人に 1 人以下で現れる主な副作用：勃起障害、性欲減退、射精障害

※これらの副作用はデュタステリド服用中止後も持続する場合があります。

- ・ 100 人に 1 以下であらわれる副作用：

蕁麻疹やアレルギー反応、発疹、頭痛、抑うつ気分、乳房障害、腹部不快感

- ・ 男性の生殖能力への影響は知られていませんが、精子の数や量を減らしたり、精子の運動を弱めたりしてしまう可能性があります。

- ・ 前立腺癌を発症する可能性の高い男性を対象とした臨床試験において、デュタステリドを服用した男性は、デュタステリドを服用しなかった男性と比べて、悪性度の高い前立腺癌の発生頻度が高かったという報告があります。

○治療費について

自由診療（保険外診療）になりますので、診察・検査・処方代はすべて自費となります。

AGA に対するデュタステリドによる治療同意書

男性型脱毛症に関して及びデュタステリドを使用することにあたり、内容及び危険性について十分な説明を受け、その内容について理解しましたので治療の実施に同意いたします。

説明日 年 月 日 説明者（署名）

同意日 年 月 日 お名前（署名）